

## **RELATO DE RUPTURA DE URETRA POR URÓLITO EM CÃO COM BEXIGA DUPLA**

**SOUZA, Rafaela Oliveira<sup>1</sup>; PALAZZO, Elzylene Léga<sup>2</sup>; SALOMÃO, Ricardo Lima<sup>3</sup>**

O sistema urinário possui um mecanismo de filtração e eliminação de substâncias residuais. Quando não ocorre tal eliminação, a urina do animal fica supersaturada, facilitando assim pequenas formações de cristais, chamados de urólitos. A urolitíase é uma afecção frequente na clínica de pequenos animais. Essa doença pode estar relacionada à dieta, obesidade, raça, idade, sedentarismo, redução do consumo de líquidos e infecções bacterianas. O animal com urolitíase pode apresentar sintomas como disúria, hábitos urinários alterados, hematúria, micção frequente e até lesões no trato urinário. Para o diagnóstico é necessária avaliação clínica e exames complementares. Este trabalho relata o caso de um cão, macho da raça Shih Tzu, de três meses de idade, atendido no Hospital Veterinário Dr. Francisco de Maeda, Ituverava/SP, diagnosticado com urolitíase e bexiga dupla, sendo que o tratamento reuniu três técnicas cirúrgicas: urestrostomia, celiotomia exploratória e orquiectomia bilateral e tratamento clínico.

---

<sup>1</sup> Faculdade "Dr. Francisco Maeda/FAFRAM.

<sup>2</sup> Faculdade "Dr. Francisco Maeda/ FAFRAM - Professora, doutora do curso de Medicina Veterinária na Faculdade Dr. Francisco Maeda – FAFRAM, Ituverava, São Paulo, Brasil.

<sup>3</sup> Faculdade Dr. Francisco Maeda/ FAFRAM - Médico Veterinário, responsável pelo Hospital Veterinário da Faculdade Dr. Francisco Maeda -FAFRAM

---