

PERITONITE DECORRENTE DE RUPTURA UTERINA E GESTAÇÃO ECTÓPICA-RELATO DE CASO

PINTO, Karine Lopes¹; **SALOMÃO**, Ricardo Lima¹; **PALAZZO**, Elzylene Léga²;
CARVALHO, Amanda de Almeida³; **SOUZA**, Flávia Bená de³

A ruptura uterina está relacionada principalmente há partos distócicos, traumas e uso de fármacos como ocitocina e prostaglandina e tem como consequências hemorragia, peritonite e feto ectópico, colocando a vida da mãe em risco. Fetos que se desenvolvem em regiões que não seja o útero, são relatos incomuns, principalmente na medicina veterinária. O objetivo deste trabalho foi relatar a presença de um feto macerado aderido em alças intestinais e peritonite secundária à ruptura uterina assim como seu tratamento. O procedimento cirúrgico foi realizado em um paciente com histórico de sangramento vaginal há 10 dias. O tratamento preconizado foi laparotomia exploratória com ovariohisterectomia (OHE) seguido de antibioticoterapia pós-operatória.

¹ Faculdade Dr. Francisco Maeda/FAFRAM – Médica(o) Veterinária

² Faculdade Dr. Francisco Maeda/FAFRAM - Professora doutora da Faculdade Dr. Francisco Maeda

³ Faculdade Dr. Francisco Maeda/FAFRAM - Graduanda em Medicina Veterinária na Faculdade Dr. Francisco Maeda.
